

M. le Président, après avoir mis aux voix l'admission de MM. Bézagu, Remeaud, Morquer, Rodriguez, Noachovitch et Gausse, les proclame membres de la Société.

Suivant avis de M. le Trésorier, M. le capitaine Bézagu ayant rempli les conditions prescrites par les statuts est proclamé membre à vie.

Il est donné connaissance des communications suivantes :

Nouvelles localités de plantes observées dans les cantons de Corbeil-Sud, de Milly-Nord (Seine-et-Oise) et de Melun-Ouest (Seine-et-Marne);

PAR M. M. DESPATY.

2^e LISTE ¹.

Ranunculus nodiflorus L. — Dannemois; mares des rochers siliceux, plateau de la cote 136.

R. flabellatus Desf. race *R. dimorphorrhizus* Brot. — Dannemois : pelouses des carrières de grès, cote 136. — Auvernaux : bois des Montis.

Anemone Pulsatilla L. race *A. Linnæana* Rouy et Fouc. — Soisy : pentes Sud de la Butte aux Petits Pois. — Dannemois : pentes de la cote 136, RR. — Beauvais : pelouses de la dérivation de la Vanne.

Sisymbrium Thalianum Gay var. *pusillum* E. Petit. — Nainville : clairières du bois du Vieux Cimetière.

Draba majuscula Rouy et Fouc. — Champcueil : pelouses, clairières du bois de Noisement. — Dannemois : pelouses de la Vanne.

Iberis amara L. race *I. ruficaulis* Lej. — Soisy : carrières de la Butte à Pierrot. — Champcueil : plateau de Noisement.

1. Voir plus haut, p. 131.

Lepidium rudera L. — Ballancourt : près de la gare.

Helianthemum polifolium DC. — Beauvais : sables de l'ancien Télégraphe. — Soisy : abondant, route de la Ferté-Alais; Butte aux Petits Pois.

Viola odorata L. var. γ . *dumetorum* Jord. — Nainville : pied des murs du parc.

Silene nutans L. et s.-var. *livida* Otth. — Beauvais : bois des Plaquères. — Dannemois : pelouses de la Vanne.

Sagina ciliata Fries. — Dannemois : pelouses du plateau 136.

Spergula pentandra L. — Dannemois : lieux desséchés de la cote 136, RR.

S. Morisonii Bor. — Dannemois : sables et pelouses du plateau 136.

Spergularia segetalis Pers. — Nainville : champs à la limite du département.

Elatine Alsinastrum L. — Nainville : bois de la Mare Blanche; var. *nana* Despaty. — Plante naine dans toutes ses parties; diffère du type par : tiges de 1 à 4 centimètres, grêles (1 mm. de diamètre environ) couchées, simples ou peu rameuses.

Diagn. lat. — Planta omni modo nana, caulibus brevissimis (1-4 cm.), gracilibus (1 mm. diam. circiter), prostratis, simplicibus vel parce ramosis, a typo facile distinguitur.

Hab. — Nainville : lieux desséchés, lisière du bois de Camp Rémi.

Geranium lucidum L. — Champcueil : abondant, rochers de Noisement.

Hypericum montanum L. — Dannemois : pentes boisées de la cote 136. — Saint-Sauveur : marais du ru des Fontaines.

Monotropa Hypopitys L. — Saint-Sauveur : bois des Fontaines. — Soisy : Butte aux Petits Pois.

Genista pilosa L. — Soisy : pentes Nord-Ouest du Tertre Blanc. — Beauvais : ancien Télégraphe.

Trifolium striatum L. — Beauvais : pelouses des Plaquères, en compagnie du *T. glomeratum* L.

Vicia sepium L. s.-var. *ochroleuca* Rouy. — Nainville : friches de Camp Rémi.

V. Cracca L. var. *argentea* Coss. et Germ. — Même localité.

V. gracilis Lois. — Auvernaux : entre la ferme de Portes et le village.

Lathyrus Nissolia L. — Nainville : moissons, route d'Auvernaux.

L. sphæricus Retz. — Nainville : friches de Camp Rémi.

Rosa pimpinellifolia L. var *typica* Ry et Camus. — Dannemois : cote 136; s.-var. *albiflora* Ry et Camus; s.-var. *roseiflora* Ry et Camus; var. *microphylla* Ry et Camus. — Même localité.

Rosa canina L. var. *lutetiana* Ry. — Beauvais : taillis autour des Plaquères; broussailles des carrières.

R. canina L. var. *dumalis* Bisch. — Dannemois : cote 136.

Agrimonia odorata Mill. — Nainville : chemin de l'Homme mort.

Sorbus latifolia Pers. — Champcueil : bois sous la ferme de Noisement.

Amelanchier vulgaris Mœnch. — Dannemois, pentes boisées, rochers et plateau de la cote 136, abondant. — Soisy : Butte à Pierrot; Butte aux Petits Pois.

Epilobium spicatum Lamk. — Saint-Sauveur : bois des Fontaines.

Oenothera laciniata Hill. — (*O. sinuata* L.). — Originaire de l'Amérique. — A été observé en Suisse et en Allemagne, à notre connaissance non encore signalé en France (Détermination du Dr Thellung). — Saint-Sauveur-sur-École : partie sèche du marais des sources du ru des Fontaines.

Lythrum Hyssopifolia L. — Nainville : plaine entre le village et le bois de Camp Rémi.

Tillæa Vaillantii Willd. — Dannemois : mares siliceuses du plateau 136. — Champcueil : mares du plateau de Noisement.

Sedum hirsutum All. — Champcueil : rochers siliceux de Noisement.

S. sexangulare DC. — Champcueil : rochers siliceux de Noisement. — Dannemois : pelouses de la cote 136.

S. elegans Lej. — Beauvais : près de la sablière de l'ancien Télégraphe.

Peucedanum Oreoselinum Mœnch. — Soisy : Butte à Pierrot.

P. Cervaria Lapeyr. — Dannemois : abondant sur les pentes boisées de la cote 136.

Bupleurum tenuissimum L. — Soisy : pentes de la Butte aux Petits Pois. — Dannemois : plateau de la cote 136.

Rubia peregrina L. — Dannemois : plateau 136. — Mondeville : près de la route de Baulne.

Hypochæris maculata L. — Dannemois : abondant sur les pentes Nord et Nord-Est de la cote 136.

Helminthia echioides Gært. — Dannemois : lieux incultes à la base de la cote 136.

Samolus Valerandi L. — Nainville : mare près du cimetière. — Saint-Sauveur : marais des sources du ru des Fontaines.

Digitalis lutea L. — Dannemois : pentes de la cote 136; var. β . *ciliata* Lej. et Court. — Dannemois : avec le type.

Limosella aquatica L. — Nainville : allée des Fontaines, abondant; Grande-Vuidange. — Saint-Sauveur : allée au-dessus du marais des Fontaines.

Veronica Anagallis L. race *V. aquatica* Bernh. — Saint-Sauveur : marais des Fontaines.

V. scutellata L. — Nainville : mare à la lisière de Camp Rémi; bois de la Mare Blanche.

V. prostrata L. — Dannemois : pelouses de la cote 136.

V. acinifolia L. — Nainville : friches à la lisière de Camp Rémi. — Auvernaux : route de Portes.

Mentha viridis L. — Nainville : talus de la route, entrée du village, Sud.

Stachys lanata Jacq. — Ponthierry : naturalisé près de la gare.

Scutellaria minor L. — Nainville : allée des Fontaines; bois de la Mare Blanche.

Brunella grandiflora Jacq. — Soisy : çà et là, sur la Butte aux Petits Pois.

Teucrium montanum L. — Soisy : pelouses arides de la Butte à Pierrot.

Daphne Laureola L. — Champcueil : plateau de Noisement. — Beauvais : près de la Sablière du Télégraphe. — Mondeville : petit bois au Sud-Est du village.

Damasonium stellatum Daléch. — Nainville : bord d'une mare près du cimetière.

Alisma Plantago L. var. γ . *angustifolium* Kunth. — Nainville : mare de la plaine, à la lisière du bois de Camp Rémi.

Ornithogalum pyrenaicum L. var. β . *flavescens* Baker. — Nainville : parc du château.

Iris foetidissima L. — Beauvais : bois entre la Padole et la ferme de Noisement.

Aceras anthropophora R. Br. — Courances : dérivation de la Vanne, R.

Orchis Francheti Camus (*O. Simia* \times *purpurea*). — Soisy : flanc Sud-Est de la Butte aux Petits Pois.

Epipactis palustris Crantz. — Saint-Sauveur : marais des Fontaines.

E. atrorubens Schultz. — Soisy : pentes de la Butte à Pierrot; Butte aux Petits Pois. — Beauvais : pelouses des carrières.

Carex ericetorum Poll. — Soisy : pentes Sud-Est du Tertre Blanc, R. — Dannemois : clairières de la cote 136, au-dessus des rochers des « Francs-tireurs ».

C. tomentosa L. — Pentes boisées de la cote 136, Nord-Est. — Soisy : talus de la route de la Ferté-Alais.

Cyperus nouveaux de Madagascar;

PAR M. H. CHERMEZON

Le genre *Cyperus*, même allégé des *Mariscus*, *Pycreus* et *Juncellus*, est représenté à Madagascar par un nombre d'espèces relativement élevé. Beaucoup étaient déjà connues depuis plus ou moins longtemps; la revision des Cypéracées malgaches du Muséum et l'examen des collections de MM. Perrier de la Bâthie et d'Alleizette m'ont cependant permis de reconnaître plusieurs espèces nouvelles, quelques-unes très remarquables, dont on trouvera ici les diagnoses.

Cyperus psammophilus n. sp. [sect. *Cuspidati*]. — Annuus, caespitosus. Caulis gracilis (apice 0,5-1 mm. diam.), 1-10 cm. long., lævis, subteres apice vix trigonus, basi haud bulbosus. Folia \pm numerosa, caule breviora vel æquilonga, arcuata, 0,5-1,5 mm. lat., rigida vel mollia, \pm involuta vel plicata, margine scabriuscula; vaginæ fusco-rubescens. Bracteæ involucrales 4-6, scabriusculæ, \pm patentés, longæ, infima usque ad 2-6 cm. long., 0,5-1,5 mm. lat. Anthela in capitulum unicum densum multispiculatum (rarius depauperatum) contracta, rarius divaricatim